

【イチゴの炭疽病対策】炭疽病は、うどんこ病、萎黄病と並ぶイチゴ栽培での重要病害です。炭疽病の病原菌には、「シングラータ」と「アキュテイタム」の2種類があります。「シングラータ」による感染では葉に斑点状の病斑が発生し、「アキュテイタム」による感染は葉枯れ炭疽病とも呼ばれ葉の縁から枯れ込みが発生します。イチゴ炭疽病と呼ばれるものは一般には「シングラータ」によるもので、葉柄やランナー、クラウンなどのあらゆる部位に感染して発病し、さらに萎れやクラウンへの感染により枯死に進むため大きな被害となります。親株を育成する育苗ハウスでイチゴ炭疽病が発生すると苗の廃棄によって苗不足の問題が起こります。また感染した親株や定植用の苗が本圃に持ち込まれることで、感染が広がり萎れや枯死が発生、収穫が激減するなど甚大な被害を及ぼすこともあります。



【イチゴの炭疽病登録薬剤】

薬剤名	FRAC	使用時期	希釈 倍数	散布液量 / 10a	使用 回数
アントコル顆粒水	M03	仮植栽培期	500倍	150~ 200L	6回以内
ベルコートFL	M01	収穫前日まで(生育期) 育苗期(定植前)	2,000倍 1,000倍	100~ 300L	5回以内
NEW フレイトFL	M07, 53	収穫前日まで	2,000~ 4,000倍	100~ 300L	4回以内
ファンベル顆粒水	M07, 11	収穫前日まで	1,000倍	100~ 300L	3回以内
セ化°ア-FL20	12	収穫前日まで	1,000倍	100~ 300L	3回以内
ニイバー-水和剤	10, 1	収穫前日まで	1,000倍	100~ 300L	3回以内
ゲッター-水和剤	10, 1	収穫開始21日前まで	1,000倍	100~ 300L	3回以内

【防除のポイント】

- 健全な親株を使用し育成する(無病の株を使用する)
- 炭疽病が発病した苗と一緒に育苗した「苗」は親株にしないようにする
- 発病した株を見つけたら速やかに撤去し適切に処分する
- 密植を避けて風通しをよくします。下葉の除去も有効
- 過度の窒素肥料施用は避ける
- 化学薬剤は、「早い時期」から「定期的」に、「違う系統の剤」を「ローテーション」散布すること
- 下葉の除去などのクラウンを傷つけるような作業後は、重点的に薬剤散布を行い予防に努めること

7月勉強会

「イチゴの育苗期栽培オススメ情報」

1.日時

7月9日(水) 13:30~ @三木本社
7月10日(木) 13:30~ @観音寺営業所

2.勉強会内容

いちご育苗~定植以降の病害虫管理

より良く育苗するため、RACコードを活用したローテーション防除や病害虫の発生メカニズムについて説明します。

天敵導入でのいちご防除省力化

天敵活用のための防除注意点なども含めてご説明します

育苗期の高温障害対策について

高温、多湿、乾燥に負けない元気な育苗を行うためにアミノ酸、腐植酸、海藻を含んだバイオスティミュラント資材についてご紹介します。

QRより申込・参加頂いた方には粗品プレゼント

勉強会へのエントリーはこちらから!→



秀品収穫は
苗美人から。

適用拡大!
トマト・ミニトマト
「定植後 株元灌水時」
「定植後 灌水時」
はうれんそう、
露地栽培ならぬ鉢栽培時
も有効です。

水やりと同時に行う!
すばやく根から吸収される苗灌水1回で、速効食害停止と約1ヶ月残効!
悪い虫をつけさせない。

野菜用注用殺虫剤
ベリマーク SC
殺虫成分のFMCの殺効成分
CYAZOTHRIN 10.7%高濃度!

あなたのうちは大丈夫?!
築年数が古くなると
シロアリ被害の発生率が上昇します。
特にセルフチェックに1つでも当てはまる方はすぐにご連絡を!

セルフチェック お心当たりはありませんか?

- 家の中もしくは家の近くで羽アリを見かけた
- 5年以上シロアリ予防をしたことがない
- 床がふわふわしてきしむ
- ドア・雨戸の建付けが悪い
- 水まわりの床や壁に変色がある
- 押入れ、クローゼットの中がジメジメして湿気を感じる

1つでも当てはまったら要注意!!

LINE 公式アカウント @enpachi_agri
うれしい情報をLINEでお届け!

おともだち募集中

酷暑に打ち克つ
Heat Impact
ヒートインパクト

暑さに負けない“強さ”を引き出す
水稲はもちろん、どんな作物にも使えます

収量確保と品質維持のW効果
水稲試験評価 ※2024年全国16か所で実施

精玄米率 高
千粒重 高
整粒 高
タンパク 低
乳白等 低
海藻抽出物
微生物代謝物
アミノ酸

NEW ARRIVAL 好評発売中!

PHYTOCHROME バイオステミューラント

大気中の窒素を植物に有効利用

N-Catch
エヌキャッチ

- 収穫物の生産性と品質の向上に -

NEW 標準施用 50アル分

水稲やその他の作物に

酷暑対策 収穫物の品質向上 作物の生産性向上 肥培管理プログラム

べと病、疫病、白さび病、立枯病を
ピシッとロック!!

殺菌剤

ピシロック® フロアブル

ジャックポット® 顆粒水和剤

ヨトウムシに活性の高い「アイザワイ系統」とコナガ・アオムシ・オオタバコガに活性の高い「クルスターキ系統」の両方の殺虫活性を併せ持つハイブリッド型BT剤です

シロイチモジヨトウ 発生拡大の防止対策に!

JACKPOT

シロイチモジヨトウ ツマゾロコサヨトウ コナガ アオムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ

多彩な
パフォーマンス!

害虫防除剤

兼商 ヨーバル® フロアブル

有効成分：テトラニプロロール…18.2% IRACコード：28

★アオムシ、ヨトウムシ、オオタバコガ等のチョウ目害虫やハモグリバエ類に卓効!
★定植時の灌注、生育期の散布どちらも使えます!

AGRO-KANESHO

有機物腐熟促進

分解ヘルパーアクア

微生物が作物残さの分解を促進!
葉菜類/根菜類の収穫後の新定番!

特徴

- 有機物分解能力を持つバチルス菌を生きたままの状態で含んだ資材です
- 分解された残さは肥料成分として次の作で作物に活用されます
- 水和タイプですので農薬散布機で散布可能です

水和田タイプで省力散布

機械まき可能な「レットタイプ」(肥料成分入)もラインナップ

喜多猿ハ

ハト対策は お任せください!

様々な施設に応じた
対策案をご提案します!

ハトの糞にはこんな被害が…

- ☑ 鳥は病原菌を伝播し、健康を損なう恐れがある
- ☑ 糞を長時間放置すると、金属が腐食し建物が劣化
- ☑ 糞や羽の飛散による臭いや洗濯物へ被害がある

ハト被害を専門家が安全に解決します!!


大切な家を守るには専門業者のメンテナンスが必要です!

困ったら、えんばちおうち見守隊におまかせを!!

カーメックス® 顆粒水和剤

水田畦畔での上手な雑草対策には高い土壌処理効果を持つ「カーメックス顆粒水和剤」をお試ください。雑草発生前に使用することで45～60日間、一年生雑草を抑草できます

●散布タイミングの例●



【注意】カーメックス顆粒水和剤の使用回数は1回です

「カーメックス顆粒の水田畦畔向け上手な使い方と注意点」に関するYoutubeリンクはコチラ →



ファイト・アップ(水田用)



投げ込むだけで
穂に活力!!



- 根張りアップ
止め草から数えて3枚の葉が出てくる間に、それらに付いた根を保護し、さらに下位節間を丈夫にします。
- 食味アップ
収穫まで優先されることによる葉のしかりと残し、葉の栄養化を促進し、質の高いザンパンを創出。
- 歩留まりアップ
低温などのストレスから幼穂を保護し、不稔を抑え、同化養分の転流を促進し、「クスマ」を少なくします。

使用時期

通常栽培の場合
幼穂形成始期
出穂30～45日前
1回の投げ込みで、幼穂を保護し、収穫までの根を生きす
10アールあたり1袋(10錠)投込み
○さらに効果的 天候不順・低温下での分けつ促進→田植え後2週間以内

直播栽培の場合
生育初期 + 幼穂形成始期
出穂30～45日前
初期生育を促進し有効な分けつを確保し強い健康な稲に
生育初期 10アールあたり0.5錠(5錠)投込み
幼穂形成始期 10アールあたり1袋(10錠)投込み


DJI農業用ドローン教習

当社ドローンスクールのメリット)

1. インストラクターがドローン防除のプロ
2. 測量や自動航行など様々な制御方法を学べる
3. 空散可能な農業・肥料・資材などの情報を提供
4. 当社防除パートナーになり副収入確保も

	対面学科教習		オンライン学科教習	
	所要日数	教習料金(税込)	所要日数	教習料金(税込)
新規(初心者)5日間	2日 3日	275,000	7日 3日	203,500
新規(経験者)4日間	2日 2日	220,000	7日 2日	159,500
更新	0.5日 --	33,000	7日 --	26,400

※注:学科オンライン教習…新規・更新とも学科教習について、ご自宅や職場でパソコン受講(e-Learning)ができます。



非選択性茎葉処理除草剤

ザクサ
液剤



ザクサの耐雨性
雨が降っても効果を発揮!



アキレスファインシェード
遮光剤

大好評!!

既設のハウスに、液状の遮光剤を
吹き付けるだけで、遮光が実現します!!



株式会社 喜多猿八

【本社営業所】
〒761-0611
木田郡三木町田中 2582
TEL 087-898-1200

【観音寺営業所】
〒768-0011
観音寺市出作町北道 1062
TEL 0875-25-3086



